Республиканский научно-практический центр
психического здоровья Министерства здравоохранения
Республики Казахстан

Проблемы потребления новых психоактивных веществ в Республике Казахстан

к.м.н., Нуралиев Б.Ж.

MENTAL HEALTH
REPUBLICAN SCIENTIFIC AND PRACTICAL CENTER OF MENTAL HEALTH

Количество лиц состоящие на наркологическом учете в РК (абсолютное число)

Наименование ПАВ	2018 г.	2017 г.
Алкоголь	102 473	110 797
Опиоиды	9 835	11 453
Каннабиноиды	7 764	8 483
Сочетанное употребление ПАВ	4 754	4 618
Летучие растворители	211	259
Табак	121	162
Седативные и снотворные	23	29
Стимуляторы	147	40
Галлюциногены	7	1
Всего	**125 335**	**135 842**

MENTAL HEALTH
REPUBLICAN SCIENTIFIC AND PRACTICAL CENTER OF MENTAL HEALTH

Количество лиц состоящие на наркологическом учете в Республике Казахстан (на 100 тыс. населения)



В том числе вызванных употреблением наркотиков и психотропных веществ F11-F19 по МКБ-10 (на 100 тыс. нас.)



КОНТИНГЕНТЫ

больных психическими и поведенческими расстройствами, вызванными употреблением новых психоактивных веществ, находящихся под диспансерным и профилактическим наблюдением (абсолютное число)



Исследование потребление наркотических веществ среди молодежи*

Потребление наркотиков	В течение жизни
Наркотические вещества	16,3±1,1%
Каннабис	11,2±1%
Экстази	2,3±0,5%
Ингалянты	5,4±0,6%
Опиаты	0,9±0,3%
Амфетамины	1,0±0,3%
Транквилизаторы и седативные средства	1,5±0,4%
ЛСД и другие галлюциногены	0,8±0,3%
Кокаин	0,8±0,3%
Неталин	0,6±0,3%
Галлюциногенные грибы	0,8±0,3%
Оксибутират натрия	0,6±0,2%
Анаболические стероиды	0,8±0,3%

- В исследовании были опрошены респонденты в возрасте 16, 19 и 21 лет.
  Источник: «Отчёт о результатах исследования рисков вовлечения в химические и нехимические аддикции среди детей и молодежи Республики Казахстан, Павлодар 2013

MENTAL HEALTH
REPUBLICAN SCIENTIFIC AND PRACTICAL CENTER OF MENTAL HEALTH

Анализ потребления новых психоактивных веществ среди пациентов стационарного наркологического профиля Республики Казахстан (Прилуцкая М.В., 2017)



MENTAL HEALTH
REPUBLICAN SCIENTIFIC AND PRACTICAL CENTER OF MENTAL HEALTH

Анализ потребления новых психоактивных веществ среди пациентов стационарного наркологического профиля Республики Казахстан (Прилуцкая М.В., 2017)

- По результатам анализа по состоянию за первое полугодие 2017 года в Республике Казахстан распространенность потребления НПВ в течение жизни составила 0,99%, в течение последнего месяца - 0,89%.
- г. Алматы – 8,77% в СКО – 3,4%.

- В 84,9 - синтетические каннабиноиды,
- 34,2% - синтетические катиноны,
- 5,4% - сочетание каннабиноидов и катинонов

MENTAL HEALTH
REPUBLICAN SCIENTIFIC AND PRACTICAL CENTER OF MENTAL HEALTH

Регион	Кол-во пролеченных пациентов, зависимых от НПВ
Акмолинская	7
Актюбинская	5
Алматинская	3
Атырауская	2
ЗКО	-
Жамбылская	4
Карагандинская	3
Костанайская	4
Кызылординская	-
Мангыстауская	-
ЮКО	2
Павлодарская	18
СКО	28
ВКО	11
г. Астана	16
Г. Алматы	109
Республика Казахстан	**212**

MENTAL HEALTH
REPUBLICAN SCIENTIFIC AND PRACTICAL CENTER OF MENTAL HEALTH

Количество пациентов с психическими поведенческими расстройствами вследствие употребления ПАВ, прошедших программу МСР в 2017-2018гг.



Количество пациентов с психическими поведенческими расстройствами вследствие употребления новых психоактивных веществ, прошедших программу МСР в 2017-2018гг.



MENTAL HEALTH
REPUBLICAN SCIENTIFIC AND PRACTICAL CENTER OF MENTAL HEALTH

Количество пациентов с психическими поведенческими расстройствами вследствие употребления ПАВ, прошедших программу МСР в 2017-2018гг. по видам наркотического вещества



Методические рекомендации

- Методические рекомендации ***«Методы диагностики, лечения расстройств, связанных с употреблением новых психоактивных веществ (синтетические каннабиноиды)»,*** РНПЦ МСПН, Павлодар, 2015;
- Информация о клинико-динамических особенностях зависимости, синдроме отмены синтетических каннабиноидов (перечисление отдельных симптомов), клиническая симптоматика, возникающая в результате единичных приёмов синтетических каннабиноидов, симптомы опьянения и острой интоксикации СК, психопатологические нарушения;
- Терапия состояний, ассоциированных с приёмом синтетических каннабиноидов, купирование острой интоксикации, психосоциальная поддержка лиц, зависимых от приёма синтетических каннабиноидов, медикаментозное сопровождение;
- Необходимым оставалось создание специфичных алгоритмов терапии зависимости, вызванной потреблением синтетических каннабиноидов.

Клинический протокол

- Клинический протокол диагностики и лечения ***«Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением новых психоактивных веществ»***

- Одобрен Объединенной комиссией по качеству медицинских услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан от «14» декабря 2017 года Протокол №35

Благодарю за внимание!

www.mentalcenter.kz